

SECURITY

660 WP

Oxyde de Cuivre 600 g/kg + Métalaxyl-M 60 g/Kg

FONGICIDE PRÉVENTIF ET CURATIF EMPÊCHE LA POURRITURE DES CABOSSES

SECURITY 660 WP
Oxyde de Cuivre 600 g/kg + Métalaxyl-M 60 g/Kg

FONGICIDE PRÉVENTIF ET CURATIF
Efficace contre la pourriture des cabosses
1 Sachet pour 1 Réservoir

Sans SECURITY (Sad face icon)

Avec SECURITY (Happy face icon)

N° HOMOLOGATION : 17 1866 Fo
POIDS NET : 50 g

ATTENTION

Avec SECURITY, le Cacao est PROPRE !

PHYTOSANITAIRES - MATÉRIELS DE TRAITEMENTS - SEMENCES - ENGRAIS

PHYTOTOP - Riviera Palmeraie, Rond Point ADO - 01 BP 420 ABJ 01
Tél.: 22 49 22 83 - Cel.: 77 70 10 05 - E.mail: phytotop@phytotop.net

ABIDJAN - Cel.: 67 45 77 84	SAN-PEDRO - Cel.: 77 70 09 99	GAGNOA - Cel.: 09 56 69 87	DALOA - Cel.: 79 79 44 73
KORHOGO - Cel.: 87 21 88 86	DUÉKOUÉ - Cel.: 77 70 10 00	DIVO - Cel.: 09 79 31 28	ABENGOUROU - Cel.: 77 74 83 79



SECURITY

660 WP

Oxyde de Cuivre 600 g/kg + Métalaxyl-M 60 g/Kg



PUISSANT FONGICIDE PRÉVENTIF et CURATIF

FORMULATION : Poudre mouillable

SECURITY 660 WP est l'association d'un puissant Fongicide Préventif et d'un puissant Fongicide de Curatif polyvalent, très efficaces pour la protection des cabosses de cacaoyers contre la pourriture brune causée par les champignons *Phytophthora palmivora* et *Phytophthora mégakarya*.

SECURITY 660 WP empêche la pourriture des cabosses de cacao.

CLASSE TOXICOLOGIQUE (FAO/OMS) : Classe III, Peu Dangereux

SECURITY 660 WP est un produit à faible toxicité pour l'Homme. SECURITY 660 WP ne provoque pas de brûlure sur la peau de l'applicateur ni de maux de tête après le traitement.

DOSE D'APPLICATION : 200g pour 1 Hectare

1 sachet de 50g pour un Atomiseur rempli à 10L d'eau.

MÉTHODES D'APPLICATIONS

4 à 6 applications par an pendant la saison des pluies (Avril à Septembre)

- Le 1^{er} traitement commence dès le début de la saison des pluies.
- Le traitement est ensuite répété tous les 21 à 30 jours pendant toute la période des pluies.

N.B.: SECURITY 660 WP peut être mélangé à l'insecticide CACAOSUPER 40 EC pour un traitement à la fois contre les insectes (Mirides, Borer...) et contre la pourriture brune des cabosses. Dans ce cas, l'application doit cibler les cabosses, les cherelles (petites cabosses) et les feuillages.

DELAI AVANT RECOLTE : 7 Jours

N° HOMOLOGATION : 17-1866 Fo

4 BONNES PRATIQUES AGRICOLES À OBSERVER

Les Bonnes Pratiques suivantes sont recommandées aux Planteurs de Cacao

- 1- Faire une récolte sanitaire (enlever les cabosses déjà pourries) avant le démarrage de la saison des pluies.
- 2- Enterrer les cabosses pourries enlevées hors du champs.
- 3- Effectuer une taille d'aération de la plantation. Elle consiste à couper les gourmands, éliminer les pieds trop serrés pour respecter l'écartement optimum d'environ 3m sur 2.5m.
- 4- Poursuivre la récolte sanitaire périodique durant toute la période des pluies.