

# REZO 50 EC

Cyperméthrine 50 g/l



## INSECTICIDE EFFICACE CONTRE LES PRINCIPAUX INSECTES RAVAGEURS DES CULTURES MARAÎCHÈRES



PHYTOSANITAIRES - MATÉRIELS DE TRAITEMENTS - SEMENCES - ENGRAIS

PHYTOTOP - Riviera Palmeraie, Rond Point ADO - 01 BP 420 ABIDJAN 01 - RC1  
tél.: (225) 22 49 22 83 - E-mail: phytotop@phytotop.net - Web: www.phytotop.net

BIDJAN - Cel.: 67 45 77 84 SAN-PEDRO - Cel.: 77 70 09 99 GAGNOA - Cel.: 09 56 69 87 DALOA - Cel.: 79 79 44 73  
ORHOGO - Cel.: 87 21 88 86 DUEKOUÉ - Cel.: 77 70 10 00 DIVO - Cel.: 09 79 31 28 ABENGOUROU - Cel.: 77 74 83 79

PhytoTop

# REZO 50 EC

Cyperméthrine 50 g/l

## INSECTICIDE EFFICACE CONTRE LES PRINCIPAUX INSECTES RAVAGEURS DES CULTURES MARAÎCHÈRES

FORMULATION : EC (Emulsion Concentrée)

### USAGE :

REZO 50 EC est un insecticide très efficace contre les principaux ravageurs des cultures maraîchères (tomate, gombo, aubergine, haricot, chou, laitue, piment, oignon, concombre, pastèque etc.).

REZO 50 EC agit par contact et par ingestion sur les insectes nuisibles des cultures maraîchères.

REZO 50 EC a une action foudroyante contre les insectes.

### DOSE D'APPLICATION : 1L/Ha

40 mL + 15 L d'eau pour 400m<sup>2</sup>

Remplir une fois le bouchon du bidon de 200 mL ou 1 L pour 15 litres d'eau dans un pulvérisateur à dos.



### MODE D'EMPLOI :

REZO 50 EC s'applique en pulvérisation foliaire à raison de 200 à 400 L de bouillie par hectare.

### FREQUENCE D'APPLICATION :

Un traitement par semaine dès les premières attaques.

### DELAI AVANT RECOLTE : 7 jours

### N° HOMOLOGATION : 15-1569 In

### ANTIDOTE :

Il n'y a pas d'antidote spécifique, il faut faire un traitement symptomatique.