

FURASOL 50 GR

Oxamyl 50 g/kg



Nématicide et Insecticide

Cultures Maraîchères, Palmier à Huile
et Espaces Verts



PHYTOSANITAIRES - MATERIELS DE TRAITEMENTS - SEMENCES - ENGRAIS

PHYTOTOP - Riviera Palmerale, Rond Point ADO - 01 BP 420 ABIDJAN 01 - RCI
Tél.: (225) 22 49 22 83 - E-mail: phytotop@phytotop.net - Web: www.phytotop.net

ABIDJAN - Cel.: 67 45 77 84 SAN-PEDRO - Cel.: 77 70 09 99 GAGNOA - Cel.: 09 56 69 87 DALOA - Cel.: 79 79 44 73
KORHOGO - Cel.: 87 21 88 86 DUEKOUÉ - Cel.: 77 70 10 00 DIVO - Cel.: 09 79 31 28 ABEINGOUROU - Cel.: 77 74 83 79



FURASOL 50 GR

Oxamyl 50 g/kg



NÉMATICIDE ET INSECTICIDE POUR CULTURES MARAÎCHÈRES, PALMIER À HUILE ET ESPACES VERTS

FORMULATION : GR (Granulé)

USAGE

FURASOL 50 GR a une action à la fois nématicide et insecticide. Il agit par systémie racinaire et par contact. Il assure un contrôle très efficace contre les principaux nématodes et insectes ravageurs de nombreuses cultures, principalement les cultures maraîchères (Tomate, laitue, piment, oignon, pastèque etc).

FURASOL 50 GR assure aussi un contrôle très efficace contre les insectes vecteurs du blast chez le Palmier à huile.

L'application de FURASOL 50 GR permet d'assainir le sol, favorisant ainsi une bonne germination, un bon développement racinaire et une croissance rapide des plants.

DOSE D'APPLICATION

- **CULTURES MARAÎCHÈRES ET ESPACES VERTS : 40 Kg/Ha, soit 4 g/m².**
De façon pratique, remplir 4 fois le bouchon du stylo (BIC) pour 1 m².
- **PALMIER À HUILE :**
 - En Pépinière : 2 g / plant, Remplir 2 fois le bouchon du stylo (BIC) pour un plant.
 - En Plantation : 4 à 5 g / plant, Remplir 4 à 5 fois le bouchon du stylo (BIC) pour un plant.

METHODE D'APPLICATION

- **CULTURES MARAÎCHÈRES**
FURASOL 50 GR s'applique en épandage au sol, à la volée ou autour du plant, dans un rayon de 10 cm. Pour faciliter l'application, FURASOL 50 GR peut être mélangé avec du sable ou de l'engrais (le mélange avec un autre support permet d'augmenter le volume à appliquer).
- **PALMIER À HUILE**
FURASOL 50 GR s'applique dans le coeur du Palmier, au niveau de la flèche. Cette méthode d'application est la même en pépinière et en plantation.

PERIODE D'APPLICATION

- **CULTURES MARAÎCHÈRES**
Le traitement de FURASOL 50 GR s'effectue en épandage sur les planches de la pépinière pour la désinfection du sol.
Une semaine après la levée des plants (semis direct) ou après le repiquage (plants issus de la pépinière), le traitement se fait par épandage à la volée ou autour des plants dans un rayon de 10 cm.
- **PALMIER À HUILE**
FURASOL 50 GR s'applique pendant toute la période de sensibilité à la maladie (Septembre à Février). Le Traitement s'effectue une (01) fois par mois en pépinière et en plantation.

N° HOMOLOGATION : 17 1905 Ne

ANTIDOTE :

Il n'y a pas d'antidote spécifique, il faut faire un traitement symptomatique.