

MALOFLA PLUS 200 OD

Cyhalofop-butyl 150g/l + Bispyribac-sodium 50 g/L



HERBICIDE SELECTIF DU RIZ



DÉSHERBAGE RAPIDE, PROPRE ET ÉCONOMIQUE DU RIZ

PHYTOSANITAIRES - MATÉRIELS DE TRAITEMENTS - SEMENCES - ENGRAIS

Rivière Palmeraie, Rond Point ADO - 01 BP 420 ABJ 01 - Tél.: 27 22 49 22 83
Cel.: 07 58 94 93 10 - 07 77 70 10 03 - Email: phytotop@phytotop.net

ABIDJAN - Cel.: 07 67 45 77 84 SAN-PEDRO - Cel.: 07 01 36 12 39 GAGNOA - Cel.: 07 09 58 69 62 DALOA - Cel.: 07 77 70 10 01
KORHOGO - Cel.: 07 09 56 69 87 DUEKOUÉ - Cel.: 07 77 70 10 00 DIVO - Cel.: 07 09 79 31 28 ARENGOUR - Cel.: 07 77 74 83 79

BOUAKÉ - Cel.: 07 59 41 49 19



MALOFLA PLUS 200 OD

Cyhalofop-butyl 150g/l + Bispyribac-sodium 50 g/L

HERBICIDE PRÉ-LEVÉE SÉLECTIF DU RIZ

MATIERE ACTIVE : CYHALOFOP-BUTYL 150g/L + BISPYRIBAC-SODIUM 50 g/L

FORMULATION : OD (SUPENSION CONCENTREE HUILEUSE)

USAGE

MALOFLA PLUS 200 OD est un herbicide pré levée ou post levée précoce parfaitement sélectif du riz. Il permet un désherbage rapide et économique de tout type de riz (riz pluvial sur côte, plaine, et flanc de montagne, riz de bas fond, riz irrigué).

MALOFLA PLUS 200 OD, appliqué au sol, agit comme une colle en empêchant la germination des mauvaises herbes du riz.

MALOFLA PLUS 200 OD, élimine la plupart des mauvaises herbes y compris les mauvaises herbes qui ressemblent aux riz (les faux riz).

DOSE D'APPLICATION : 0.5L – 1L/ha

- 75 ml à 80 ml par pulvérisateur de 15 L d'eau, soit 2 fois la dosette sur le bidon pour 15 L d'eau.

METHODE D'APPLICATION

MALOFLA PLUS 200 OD, s'applique sur le sol nu avant la levée des mauvaises herbes (2 à 4 jours avant le semis ou le repiquage du riz). Le traitement se fait l'aide d'un pulvérisateur à dos.

- En culture pluviale, l'application doit se faire sur un sol humide et de manière homogène.
- En culture irriguée, il faut absolument vider l'eau des casiers 24 heures avant de faire le traitement et remettre l'eau 2 jours après l'application.

N.B. : l'application peut aussi se faire en post levée précoce, c'est à dire au plus tard 5 jours après le semis ou le repiquage du riz.

DELAI AVANT RECOLTE : 15 jours

N° HOMOLOGATION: 23 3214 He

ANTIDOTE

il n'y a pas d'antidote spécifique, il faut faire un traitement symptomatique