

TIGAFLA

100 SL
IMAZETHAPYR 100 g/L



HERBICIDE sélectif Pré et Post levée l'arachide, haricot, soja, niébé

ARACHIDE



SOJA



HARICOT



PHYTOSANITAIRES - MATERIELS DE TRAITEMENTS - SEMENCES - ENGRAIS

Rivière Palmeraie, Rond Point ADO - 01 BP 420 ABJ 01 - Tél.: 27 22 49 22 83
Cel.: 07 58 94 93 10 - 07 77 70 10 03 - E.mail: phytotop@phytotop.net

ABIDJAN - Cel.: 07 67 45 77 84 SAN-PEDRO - Cel.: 07 01 36 12 39 OAHNOA - Cel.: 07 09 58 69 62 DALOA - Cel.: 07 77 70 10 01
KORHOGO - Cel.: 07 09 56 69 87 DUEKOU - Cel.: 07 77 70 10 00 DIVO - Cel.: 07 09 79 31 28 ABHGOUR - Cel.: 07 77 74 83 79

BOUAKÉ - Cel.: 07 89 41 49 19

PhytoTop

TIGAFLA

100 SL
IMAZETHAPYR 100 g/L

HERBICIDE sélectif Pré et Post levée l'arachide, haricot, soja, niébé

FORMULATION : SL Concentré Soluble

USAGE :

TIGAFLA 100 SL est un herbicide sélectif de l'arachide, haricot, soja, niébé....

TIGAFLA 100 SL assure un désherbage rapide, efficace et économique des mauvaises herbes graminées et dicotylédones.

TIGAFLA 100 SL à une action systémique. Il est à la fois absorbé par les racines et par les feuilles des mauvaises herbes, ce qui a pour effet de bloquer leur croissance et de les éliminer.

DOSE D'APPLICATION :

1L – 1.5L/Ha

60 à 200 L /Ha

100 ml à 150 ml pour 15 l d'eau, soit 2 à 3 bouchons pour 15L d'eau.

METHODE D'APPLICATION :

TIGAFLA 100 SL s'applique en mélange à l'eau, à l'aide d'un pulvérisateur à dos.

- En Pré levée : 1 à 2 jours après semis.

- En Post levée : 7 à 10 jours après le semis (stade 4 à 8 feuilles) des arachides, haricots ou soja....

ANTIDOTE

il n'y a pas d'antidote spécifique, il faut faire un traitement symptomatique

N° HOMOLOGATION : 24 3336 He