

COLNOUMAN

400 EC

S-Metolachlore 250g/L + Prometryne 150g/L



Herbicide Sélectif du Coton, Maïs, l'Arachide, Riz, Haricot, Soja



PHYTOSANITAIRES - MATERIELS DE TRAITEMENTS - SEMENCES - ENGRAIS

Rivière Palmeraie, Rond Point ADO - 01 BP 420 ABJ 01 - Tél.: 27 22 49 22 83
Cel.: 07 58 94 93 10 - 07 77 70 10 03 - Email: phytotop@phytotop.net

ABIDJAN - Cel.: 07 67 45 77 84 SAN-PEDRO - Cel.: 07 01 36 12 39 GAGNOA - Cel.: 07 09 56 69 62 DALOA - Cel.: 07 77 70 10 01
KORHOGO - Cel.: 07 09 56 69 87 DUEKOU - Cel.: 07 77 70 10 00 DIVO - Cel.: 07 09 79 31 28 ABINGOUR - Cel.: 07 77 74 83 79

BOUAKÉ - Cel.: 07 59 41 49 19



COLNOUMAN

400 EC

S-Metolachlore 250g/L + Prometryne 150g/L

Herbicide Sélectif du Coton, Maïs, l'Arachide, Riz, Haricot, Soja

FORMULATION : Emulsion concentrée (EC)

MATIERE ACTIVE : S-Metolachlore 250g/l + Prometryne 150g/l

USAGE

COLNOUMAN 400 EC est un herbicide pré-lévé sélectif de nombreuses cultures (coton, arachide, riz, maïs, haricot, soja) destiné au désherbage des mauvaises herbes.

CIBLES:

COLNOUMAN 400 EC est efficace sur un large spectre de mauvaises herbes telles que: Digitaria, horizontalis, Eleusine indica, Paspalum orbiculare, Ipomea, eriocarpa, etc.

DOSE D'APPLICATION :

Volume de bouillie : 60 L/ha

Dosage : 750 mL + 15 L d'eau pour 0.25 ha

Volume de bouillie : 200 L/ha

Dosage : 250 mL + 15 L d'eau pour 800m²

METHODE D'APPLICATION :

COLNOUMAN 400 EC s'applique en mélange à l'eau à l'aide d'un pulvérisateur à dos, sur le sol nu et humide juste après le semis au plus tard 1 à 2 jours après. Faire l'application sur un sol humide (après une pluie) augmente l'efficacité du traitement.

CONDITIONNEMENT DISPONIBLE :

- Bidon de 750 mL
- Bidon de 1 L

N° HOMOLOGATION: : 19 2229 He

ANTIDOTE : il n'y a pas d'antidote spécifique, il faut faire un traitement symptomatique.