

MYSTIK 40 EC

Acétamipride 20 g/l + Cyperméthrine 20 g/l



INSECTICIDE BINAIRE EFFICACE Contre les mauvais insectes de l'ANACARDIER



PHYTOSANITAIRES - MATERIELS DE TRAITEMENTS - SEMENCES - ENGRAIS

Riviera Palmerale, Rond Point ADO - 01 BP 420 ABJ 01 - Tél.: 27 22 49 22 83
Cel.: 07 58 94 93 10 - 07 77 70 10 03 - E.mail: phytotop@phytotop.net

ABIDJAN - Cel.: 07 67 45 77 84	SAN-PEDRO - Cel.: 07 09 56 69 62	GAGNOA - Cel.: 07 09 56 69 87	DALOA - Cel.: 07 77 70 10 01
KORHOGO - Cel.: 07 77 70 09 99	DUKOUÉ - Cel.: 07 77 70 10 00	DIVO - Cel.: 07 09 79 31 28	ABENGOUR - Cel.: 07 77 74 83 79
DAOUKRO - Cel.: 07 01 36 12 39	YAKRO - Cel.: 07 69 41 49 19		

PhytoTop

MYSTIK 40 EC

Acétamipride 20 g/l + Cyperméthrine 20 g/l

INSECTICIDE BINAIRE EFFICACE Contre les mauvais insectes de l'ANACARDIER

FORMULATION : Emulsion concentrée (EC)
MATIERE ACTIVE : ACETAMIPRIDE 20g/l + CYPERMETHRINE 20g/l
CULTURES : CACAO, ANACARDE, ETC...

USAGE

MYSTIK 40 EC est un insecticide binaire très efficace contre les principaux ravageurs des cacaoyers et de l'anacardier.

MYSTIK 40 EC est très efficace contre les insectes piqueurs suceurs, les Chenilles, les Ciseleurs, les Borers.

MYSTIK 40 EC agit par contact, par injection et par voie systémique.

MYSTIK 40 EC a une action foudroyante mais aussi une action résiduelle qui prolonge son efficacité dans le temps.

DOSE D'APPLICATION : 0,5L/Ha

125 ml + 10 L d'eau pour ¼ ha, soit 2 dosettes et demi pour 10 L d'eau.

NB : Sur la base de 40 L d'eau par hectare

METHODE D'APPLICATION :

MYSTIK 40 EC s'applique en pulvérisation sur les feuilles à l'aide d'un atomiseur.

PERIODE DE TRAITEMENT : 2 APPLICATIONS/AN

- 1ère application : Après la récolte : Mai-Juin
- 2ème application : En début de floraison : Septembre-Novembre

DELAI AVANT RECOLTE : 7 jours

N° HOMOLOGATION: 19 2124 In

ANTIDOTE : il n'y a pas d'antidote spécifique, il faut faire un traitement symptomatique.